

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: COFFEE-START1

FUNCION: Fertilizante Foliar multimineral

FABRICANTE: GreenCorp Biorganiks de México, S.A. de C.V., Blvd. Luis Donaldo Colosio 1858, Col. San Patricio. C.P. 25204. Saltillo, Coah. Tel: +52 844 439 00 48 al 50. ventas@greencorp.mx

COMPOSICION QUIMICA: Nitrógeno: 20.00%; Calcio: 2.00%; Zinc: 4.00%; Boro: 4.00%; Acondicionadores y diluyentes: 70.00%.

CARACTERISTICAS FISICO-QUÍMICAS: Densidad: 1.3227 g/ml; pH: 5.23

FORMULACION: Líquido soluble

PROPIEDADES Y MODO DE ACCION: **CoffeeStart 1** es un producto que aumenta la concentración hormonal e incide en el mantenimiento de la diferenciación de yemas florales, incrementa y uniformiza la brotación en los cafetales. Está enriquecido con nutrimentos que juegan un papel fundamental, en la formación de nuevo órganos y crecimiento rápido. Apoyados por activadores fisiológicos, que minimizan los efectos de cualquier tipo de estrés.

La aplicación inmediata de **CoffeeStar 1** después de algún estímulo del medio ambiente que induzca la brotación, refuerza el proceso hacia una mayor brotación de yemas en general impidiendo su latencia y favoreciendo la uniformidad, lo cual repercute en una cosecha y producción más concentrada y precoz.

INSTRUCCIONES DE USO: Siempre calibre el equipo de aplicación y agítese vigorosamente antes de usarse. Aplicación foliar

DOSIS Y FORMAS DE APLICACIÓN EN CULTIVO DE CAFÉ:

Aplicar 1 L/ha en la etapa de prefloración o coincidiendo con la activación del crecimiento y primeras lluvias. Se recomienda aplicar **CoffeeStart** el cual se vierte en primer orden para poner los nutrientes en solución, agitando vigorosamente en la mezcla empleando agua suficiente para cubrir el follaje a punto de goteo.

CULTIVO	DOSIS	VOLUMEN DE APLICACIÓN
Café - Coffea arábica	1 L/ha	200 - 400 Litros
Banano y plátano - Musa spp	1 L/ha	18-28 Litros
Arroz - Oriza Sativa	1 L/ha	50 - 200 L
Tomate - Lycopersicum esculentum	1 L/ha	200 - 400 L
Papa - Solanum Tuberosum	1 L/ha	200 - 400 L

EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

Aplique cada 8 a 15 días. En cultivos perenes realice de 3 a 4 aplicaciones por año, realizar la primera antes de la floración con intervalos de 30 a 45 días.

INCOMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los agroquímicos, sin embargo, se sugiere hacer pruebas antes de realizar la mezcla final.

FICHA TÉCNICA

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene el producto en lugares frescos y cubiertos. No se deje al alcance de los niños ni se ponga en contacto con animales o alimentos.

TOXICIDAD: No es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación recomendadas en la etiqueta. El producto es considerado ligeramente tóxico, para humanos y animales. En caso de ingestión, provoque el vómito y consulte a su médico.

